

# UGLE



Vi har syv ynglende arter af ugle i Danmark. Ud af dem er tre arter primært tilknyttet skov eller andre tilgroede biotoper med gamle træer, nemlig natugle, skovhornugle og perleugle. Stor hornugle kan også findes i skov, men findes oftere i gamle, forladte grusgrave. Slørugle og kirkeugle findes i det åbne landbrugslandskab, og den sidste art, mosehornugle, forekommer meget fåtalligt i store og udstrakte eng- og marsklandskaber. Flertallet af uglerne er standfugle, og flyver ikke langt fra hjem.

Uglen er en kompakt fugl med et stort hoved og store, fremadrettede øjne. De sidder lodret og hviler ofte på underlaget, så benene er helt skjult i den løse fjerdragt, der får uglen til at se meget større ud end den egentlig er. Ugles øjne kan samle lyset 2-3 gange så effektivt end mennesker og har en øget lysfølsomhed. Derimod er opløsning og farveskarphed reduceret, så ugler i dagslys ser mindre skarpt end andre rovfugle og mennesker. Uglernes fremadrettede øjne er stort set ubevægelige i deres huler, hvilket betyder at de har et noget reduceret synsfelt, men derimod også en skarp afstandsbedømmelse, som er uundværlig i jagten på byttedyr. For at kompensere for det reducerede synsfelt kan uglen dreje hovedet omkring 3/4 omgang.

Ugler yngler i huller i træer eller i gamle reder fra andre rovdyr eller kragefugle. Enkelte arter ruger på jorden som fx sneuglen. De yngler parvist, men det kan forekomme at en han har mere end en hun, da det kun er hunnen der ruger. Ugler er territoriale og markerer det ved deres sang, fx den velkendte tuden hos natuglen.

Uglerne er nataktive rovdyr med skarpt nattesyn, lydløs fremfærd og særdeles veludviklet hørelse. Det er hørelsen som er helt uundværlig i jagtøjeblikket. Ugler kan med deres øre, der er forskudt sporer sig ind på sit bytte i komplet mørke, fordi de kan benytte sig af tre dimensioner i retningsbestemmelsen. Ugler lever primært af gnavere og spidsmus, men supplere gerne med mindre fugle, krybdyr, insekter og orme. Natuglens forkærlighed for gnavere er så markant, at dens ynglebestand svinger op og ned i takt med forekomsten af gnavere.

[Se mere om uglen her - klik](#)